




新冠併發

重症防治



113年9月1日前名稱為「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」



致病原

新型冠狀病毒SRAS-CoV-2

傳播途徑

吸入、直接或間接接觸途徑傳播

潛伏期


1至14天（多數為5至6天）

可傳染期

發病前2天即可能具傳染力

臨床症狀


發燒、乾咳、呼吸急促、倦怠、
肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉、
嗅覺或味覺喪失（或異常）






警示症狀，應儘速就醫

- 無發燒時（體溫 $< 38^{\circ}\text{C}$ ）心跳超過100次/分鐘
- 喘（ > 30 次/分鐘）或呼吸困難，或血氧 $\leq 94\%$
- 持續胸痛或胸悶
- 意識不清



- 皮膚、嘴唇或指甲床發青
- 無法進食、喝水或服藥
- 過去24小時無尿或尿量顯著減少
- 收縮壓 $< 90\text{mmHg}$



預防措施

建議配戴口罩之時機

- 疑似或感染呼吸道傳染病、發燒、出現呼吸道症狀（流鼻水、咳嗽或打噴嚏）
- 一週內曾密切接觸呼吸道傳染病者
- 本身免疫力低下或重症高風險者



關注並配合**中央疫情中心最新公告**防疫政策

配合COVID-19疫苗接種政策，**按時完成接種**



建議環境清消之重點

室內空間、公共設施及學生宿舍


- 保持空氣流通
- 適時執行清潔消毒
- 空調定期清潔保養，確保有效通風及維護室內空氣品質




維持**手部清潔**，注意呼吸道衛生及**咳嗽禮儀**

身體不適時建議先**留在家中觀察、休息**





疾管署強調：雖然口罩規定鬆綁，民眾生活可回歸常態，但仍應持續勤洗手、遵循咳嗽禮節等落實個人衛生好習慣，並接種COVID-19疫苗保護自己及他人



本「新冠併發重症防治」參考資料來源：衛生福利部疾病管制署<https://www.cdc.gov.tw/>
教育部學校衛生資訊網<https://cpd.moe.gov.tw/>